

AMOXIGOLD 50

Antibiotico

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Amoxicilina Trihidrato 50.0 g

Excipientes c.s.p. 100 g

INDICACIONES

AMOXIGOLD 50 es un polvo soluble indicado para cerdos para el tratamiento contra bacterias que produzcan infecciones respiratorias (*Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Glaesserella parasuis*), entéricas (*Escherichia coli*, *Salmonella spp*), sistémicas (*Streptococcus suis*) y en casos de metritis asociadas a *Escherichia coli*. En las aves se recomienda para el tratamiento contra bacterias que producen enfermedades respiratorias (*O. rhinotracheale*, *P. multocida*), sinovitis (*S. aureus*), enteritis necrótica (*C. perfringens*), salmonelosis (*Salmonella spp*) y colibacilosis (*Escherichia coli*).

MECANISMO DE ACCIÓN

La amoxicilina generalmente comparte el mismo espectro de actividad y usos que la ampicilina. Debido a que se absorbe mejor por vía oral (en no rumiantes), se pueden alcanzar niveles séricos más altos que con ampicilina. Las penicilinas suelen ser bactericidas contra las bacterias susceptibles y actúan inhibiendo síntesis de mucopéptidos en la pared celular que da como resultado una barrera defectuosa y un esferoplasto osmóticamente inestable

ESPECIES DE DESTINO

Aves y cerdos

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral, disuelto en la bebida o mezclado en el alimento.

Aves:

Administrar 20 - 40 mg de AMOXIGOLD 50 por kg de peso vivo, equivalente a 10 - 20 mg de Amoxicilina trihidrato por kg de peso vivo al día, durante 3 - 5 días.

Cerdos:

En agua de bebida administrar 32 - 40 mg de AMOXIGOLD 50 por kg de peso vivo, equivalente a 16 - 20 mg de Amoxicilina trihidrato por kg de peso vivo al día, durante 3 - 5 días. En alimento administrar 30 mg de AMOXIGOLD 50 por kg de peso vivo, equivalente a 15 mg de Amoxicilina trihidrato por kg de peso vivo al día hasta por 14 días.

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

INSTRUCCIONES

Al momento de disolver el producto en el agua asegurarse de obtener una solución transparente espolvoreando en la superficie del agua. La solución debe prepararse justo antes de su administración.

PERIODO DE RETIRO

Aves: Carne 7 días , Cerdos: Carne 14 días

PRECAUCIONES

- Mantener lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos.
- Utilizado de acuerdo a las indicaciones es un producto muy seguro.
- Venta bajo receta.

ALMACENAMIENTO

Mantener el envase original bien cerrado, en un lugar fresco y seco, entre 15 - 30 °C, a resguardo de temperaturas extremas y protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

AMOXIGOLD 50 se comercializa en bolsas de 1kg, 5 kg, 20 kg y 25 kg.

USO VETERINARIO

Avícola



Anticoccidiales

Anticoccidiales

Anticoccidiales

Anticoccidiales