

Emulmax[®] AI

Vacuna emulsionada Influenza aviar

COMPOSICIÓN

- Cada 0.5 mL contiene:
Virus de la Influenza aviar tipo A, SA/CHICKEN/MEXICO/232/94/CPA
INACTIVADO 0.0078 mL
Exipiente (emulsión oleosa) c.s.p.0. 5 mL.
- Cada dosis de 0.5 mL contiene virus vacunal de la Influenza aviar tipo A, subtipo H5N2, Cepa A/Chicken/México/232/94/CPA, que induce un título mínimo de 6,0 Log2 Unidades por dosis.

INDICACIONES

- Auxiliar en la prevención de la Influenza Aviar. Para ser empleada en reproductoras pesadas, reproductoras livianas, ponedoras comerciales y pollos de carne; conforme a los procedimientos de la campaña nacional contra la Influenza Aviar.

MECANISMO DE ACCIÓN

- EMULMAX[®] AI origina una respuesta inmune protectora. Los antígenos vacunales están adsorbidos en un vehículo oleoso altamente inmunogénico que actúa como un estimulante de atracción de células fagocíticas (macrófagos, monocitos, etc.) que favorecen la atracción de células comprometidas en la respuesta inmune. El vehículo oleoso una vez administrado no genera reacciones adversas.


ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

- Administrar por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.
- Reproductoras pesadas, reproductoras livianas y ponedoras comerciales, administrar 0.5 mL.
- Pollos de carne de una semana de edad en adelante, administrar 0.5 mL.
- La revacunación debe realizarse con al menos 4 semanas de separación entre cada aplicación.

PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos
- Vacunar solamente aves sanas.
- Mantener siempre las condiciones habituales de asepsia.
- Usar jeringas y agujas estériles.

Avícola



Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

- Todos los animales destinados a un mismo galpón deben ser vacunados al mismo tiempo.
- Después de la vacunación es necesario algún tiempo para el desarrollo de la inmunidad adecuada. Mantenga estrictas condiciones de bioseguridad para evitar exponer a las aves a desafíos por microorganismos patógenos, contra los cuales se está vacunando por un periodo no menor al requerido para la respuesta a la vacuna.
- Emplear buenas prácticas en la técnica de vacunación, especialmente en aves jóvenes para evitar que algún porcentaje de la población no reciba la dosis requerida de vacuna y queden sin inmunizar.
- Agite el producto enérgicamente antes de usarlo.
- Para facilitar su aplicación se recomienda que la vacuna este a una temperatura entre 25 °C a 30 °C, a fin de disminuir la viscosidad natural del gel frío y así facilitar la aplicación y evitar la reacción local.
- El uso de esta vacuna debe estar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.
- Utilizado de acuerdo a las indicaciones es un producto muy seguro
- Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

ALMACENAMIENTO

- Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2 °C y 8 °C.
- Evite la congelación.

PRESENTACIÓN


- EMULMAX[®] AI se comercializa en frasco por 500 mL (1000 dosis).

REGISTRO SANITARIO

- EMULMAX[®] AI, cuenta con Registro Sanitario de SENASA N° B.001.002.I.01333

USO VETERINARIO

Avícola



Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos