

Oleo Inmuno Corybact + S3 (300 mL)

Vacuna oleosa contra la enfermedad de Salmonellas paratíficas y Coriza infecciosa aviar

Fórmula exclusiva para cliente

COMPOSICIÓN

Cada dosis (0,3 mL) contiene:

<i>Avibacterium paragallinarum</i> , serovares A, B y C.....	10 ⁸ EID ₅₀ / dosis
<i>Salmonella</i> Enteritidis.....	5 x 10 ⁸ UFC/dosis
<i>Salmonella</i> Typhimurium.....	5 x 10 ⁸ UFC/dosis
<i>Salmonella</i> Infantis.....	5 x 10 ⁸ UFC/dosis
Vehículo oleoso de doble emulsión c.s.p	0,5 mL

INDICACIONES

OLEO INMUNO CORYBACT + S3, es un producto biológico inactivado y estabilizado en un vehículo de doble emulsión inmunoestimulante; destinado para el control de la enfermedad de Salmonella y Coriza infecciosa aviar en gallinas ponedoras y reproductoras.

MECANISMO DE ACCIÓN

La vacuna OLEO INMUNO CORYBACT HP + S3 origina una respuesta inmune protectora en gallinas ponedoras, reproductores y pollos de carne. Los antígenos vacunales están adsorbidos en un vehículo de doble emulsión que actúa como un estimulante de atracción de células fagocíticas (macrófagos, monocitos, etc.) que favorecen la atracción de células comprometidas en la respuesta inmune.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS


Intramuscular o subcutánea:

Ponedoras y reproductoras: Aplicar 0,3 mL por ave.

PRECAUCIONES

- Agítese bien antes del empleo y durante su uso.
- Vía de administración: Subcutánea o intramuscular.
- Vacunar solamente aves sanas.
- Mantener siempre las condiciones habituales de asepsia.
- Antes de la aplicación, se recomienda que la vacuna este a una temperatura entre 30 – 35 °C, a fin de disminuir la viscosidad natural del gel frío y así facilitar la aplicación y evitar la reacción local.
- Usar jeringas y agujas estériles.

Avícola



Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

- Mantener bajo control las condiciones que producen inmunodepresión: estrés, deficiencias nutricionales, micotoxicosis, parasitismo, coccidiosis y demás enfermedades.
- Todos los animales destinados a un mismo galpón deben ser vacunados al mismo tiempo.
- Después de la vacunación es necesario 3 a 4 semanas para el desarrollo de la inmunidad adecuada. Evite exponer las aves a desafíos por microorganismos patógenos, contra los cuales se está vacunando por un periodo no menor al requerido para la respuesta a la vacuna.
- Emplear buenas prácticas en la técnica de vacunación, especialmente en aves jóvenes para evitar que algún porcentaje de la población no reciba la dosis requerida de vacuna y queden sin inmunizar.
- Controle la inmunidad del plantel a través de pruebas serológicas periódicas.
- El uso de esta vacuna debe estar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.
- Utilizado de acuerdo a las indicaciones es un producto muy seguro.

ALMACENAMIENTO


- La vacuna debe ser almacenada y/o transportada en embalajes o vehículos isotérmicos, con hielo conservante o unidad de refrigeración que mantenga al producto a una temperatura entre +2 °C a +8 °C y al resguardo de la luz.
- Después de abrir el frasco, utilizar toda la vacuna, no guardar los sobrantes.

PRESENTACIÓN

OLEO INMUNO CORYBACT HP + S3, se comercializa en frascos de polipropileno de alta densidad con un volumen neto de 300 mL.

USO VETERINARIO

Avícola



Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos