

Oleo S3

Vacuna oleosa de doble emulsión contra Salmonellas paratíficas

COMPOSICIÓN

Cada dosis (0,5 mL) contiene:

<i>Salmonella</i> Enteritidis.....	5 x 10 ⁸ UFC/dosis
<i>Salmonella</i> Typhimurium.....	5 x 10 ⁸ UFC/dosis
<i>Salmonella</i> Infantis.....	5 x 10 ⁸ UFC/dosis
Excipiente c.s.p	0,5 mL

INDICACIONES

OLEO S3 es un producto biológico inactivado y estabilizado en un vehiculo de doble emulsión inmunoestimulante; destinado para el prevenir la descargas de Salmonella en los subproductos de gallinas ponedoras y reproductoras.

MECANISMO DE ACCIÓN

La vacuna OLEO S3 origina una respuesta inmune protectora en gallinas ponedoras, reproductoras. Los antígenos vacunales están adsorbidos en un vehículo de doble emulsión que actúa como un estimulante de atracción de células fagocíticas (macrófagos, monocitos, etc.) que favorecen la atracción de células comprometidas en la respuesta inmune.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS


Subcutánea o intramuscular.

Gallinas de postura, gallinas reproductoras: 0.5 mL/ave.

PRECAUCIONES

- Agítase el frasco antes y durante su uso.
- Vía de administración: Intramuscular, Subcutánea.
- Vacunar solamente aves sanas.
- Mantener siempre las condiciones habituales de asepsia.
- Antes de la aplicación, se recomienda que la vacuna este a una temperatura entre 25 a 30 °C, a fin de disminuir la viscosidad natural de la emulsión frío y así facilitar la aplicación y evitar la reacción local.
- Usar jeringas y agujas estériles.
- Vacunar solamente animales saludables. Mantengan bajo control las condiciones que producen inmunodepresión: estrés, deficiencias nutricionales, micotoxicosis, parasitismo, coccidiosis y demás enfermedades.

Avícola



Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

- Todos los animales de un mismo galpón deben ser vacunados al mismo tiempo.
- Después de la vacunación es necesario 3 a 4 semanas para el desarrollo de la inmunidad adecuada. Evite exponer las aves a desafíos por microorganismos patógenos, contra los cuales se está vacunando por un periodo no menor al requerido para la respuesta a la vacuna.
- Emplear buenas prácticas en la técnica de vacunación, especialmente en aves jóvenes para evitar que algún porcentaje de la población no reciba la dosis de vacuna y queden sin inmunizar.
- Controle la inmunidad del plantel a través de pruebas serológicas periódicas.
- Después de abrir el frasco, utilizar toda la vacuna, no guardar los sobrantes.
- El uso de esta vacuna debe estar bajo la supervisión de un Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO


- La vacuna debe ser almacenada y/o transportada en embalajes o vehículos isotérmicos, con hielo conservante o unidad de refrigeración que mantenga al producto a una temperatura entre +2º C a +8º C y al resguardo de la luz.

PRESENTACIÓN

OLEO S3 se comercializa en frascos de polipropileno de alta densidad, autoclavables y opalescentes con capacidad de 500 mL.

USO VETERINARIO

Avícola



Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos

Biológicos