

# Sulfaclor T

## COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Sulfacloropiridazina sódica..... | 50 g  |
| Trimetoprim.....                 | 12 g  |
| Excipientes c.s.p. ....          | 100 g |

## INDICACIONES

SULFACLOR T es efectivo contra infecciones bacterianas producidas por gérmenes susceptibles a la sulfonamidas y trimetoprim como: *Avibacterium* sp., *Mycoplasma* sp., *Pasteurella multocida*, *Salmonella* sp., *Escherichia coli*, *Eimeria* sp., entre otros.

## MECANISMO DE ACCIÓN

La Sulfacloropiridazina interfiere en la primera etapa de la síntesis de ácido fólico al competir con él ácido para amino benzóico (PABA).

El Trimetoprim es una diaminopirimidina, que actúa mediante la inhibición de la enzima reductasa del dihidrofolato (que actúa en la segunda etapa de la síntesis del Acido Fólico).

Ambas en conjunto logran la inhibición de la síntesis del ácido fólico, interfiriendo en dos etapas. Evitando la formación de purinas, logrando así interferir con del material genético bacteriano y demás factores de crecimiento bacteriano.

SULFACLOR T, es un compuesto que alcanza rápidamente elevada concentración terapéutica en la sangre y se mantiene por varias horas, lo que permite una sola administración diaria.

## ESPECIES DE DESTINO

Pollos, pavos y patos.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

**Agua de bebida:** 4 g por cada 100 kg de peso vivo.

**Alimento:** 400 g por tonelada de alimento.

Mantener el tratamiento por 5 a 7 días.

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

**PERIODO DE RETIRO**

Pollos, pavos y patos: 7 días.

**PRECAUCIONES**

- No usar en ponedoras en producción de huevos para consumo humano.
- Una vez abierto el producto consumir toda la bolsa o de lo contrario volver a sellar herméticamente.
- Una vez realizada la dilución en el agua de bebida, ésta debe consumirse totalmente.
- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

**ALMACENAMIENTO**

- Mantener el envase original bien cerrado, en un lugar fresco y seco, entre 8 -30 °C a resguardo de temperaturas extremas y protegido de la luz solar directa.

**PRESENTACIÓN**

SULFACLOR T, se comercializa en bolsas de aluminio por 1 y 5 kg.

**USO VETERINARIO**

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos