

Tiamunova 10%

Antibiótico en polvo en base a Tiamulina fumarato 10%

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Tiamulina Fumarato..... 10 g
Excipientes c.s.p. 100 g

INDICACIONES

TIAMUNOVA 10% es altamente efectivo sobre *Mycoplasma* sp., *Haemophilus* sp., *Actinobacillus* sp., *Serpulina* sp., *Leptospira* sp. y bacterias Gram Positivas que afectan a las aves y cerdos.

Es efectivo en el tratamiento de las siguientes enfermedades:

Aves:

Para el control de ERC, Sinusitis infecciosa en pavos y gallinas.

Cerdos:

Para prevenir y tratar neumonia enzootica debido a *Mycoplasma* sp., pleuroneumonia producida por *Actinobacillus* sp., poliseritis causada por *Haemophilus* sp. y disenteria porcina.

MECANISMO DE ACCIÓN

La Tiamulina tiene acción bacteriostática ya que se une a la subunidad 50's para inhibir la síntesis proteica, pero con dosis altas puede actuar como bactericida. Su base triciclica se coloca en el sitio de unión del A-ARNt, esta unión bloquea indirectamente también el sitio de unión de P-ARNt, por lo que se ve parcialmente inhibida la formación de péptidos. Asimismo, se une al sitio V del 23s ARN induciendo interacciones hidrofóbicas y cambios conformacionales que bloquean la síntesis de proteínas.

ESPECIES DE DESTINO

Aves y porcinos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Por vía oral, mezclado con el alimento

Pollos de carne, ponedoras, reproductoras y pavos:

25 – 50 g de Tiamunova 10 % por cada 100 kg de p.v.

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Cerdos:

1 – 2 kg de Tiamunova 10 % por cada tonelada de alimento

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Ponedoras y reproductoras: preventivo: 7 días en intervalo de 30 días.

Pollos de carne y pavos: 3 – 5 días.

Cerdos: 5 – 7 días.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días.

Huevos: 7 días.

PRECAUCIONES

- No debe administrarse en aves que estén bajo tratamiento con ionóforos o en los últimos 7 días antes o después del tratamiento.
- Mantener lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- Una vez abierto el producto consumir toda la bolsa o de lo contrario volver a sellar herméticamente

ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase original bien cerrado, en un lugar fresco y seco, entre 15 – 30 °C a resguardo de temperaturas extremas y protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

TIAMUNOVA 10 %, se comercializa en bolsa de 1, 5, 10, 20 y 25 kg

USO VETERINARIO

Avícola



Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos

Antibióticos